

Matériel d'usage courant pour le nettoyage

Type de matériel	Bazoulé				Lougsi				Tanghin Dassouri				Vipalogo				Yaoghin			
	Etat		Quantité	Périodicité de ravitaillement	Etat		Quantité	Périodicité de ravitaillement	Etat		Quantité	Périodicité de ravitaillement	Etat		Quantité	Périodicité de ravitaillement	Etat		Quantité	Périodicité de ravitaillement
	Bon	Mauvais			Bon	Mauvais			Bon	Mauvais			Bon	Mauvais			Bon	Mauvais		
Gants de ménage	5				2	1				0				4				3		
Gants en vrac			3 boîtes				8 boîtes												3 boîtes	
Torchons	5				2									1				1		
Serpillères	5				2	3								1				1		
Poubelle	9					2			1	4				4						7
Désinfectant																				
Détergent			0				0							Ajax (1)						0
Grand tambour	5				2	2								4				2		
Petit tambour	4					3			2					1				4		
Grand plateau	6					4					suffisant			3				3		
Petit plateau	4						0				suffisant					0		10		
Boite d'accouchement	3				1	1			1	2				2				2		
Boite de petite chirurgie	3				1				2	2				1	1			2	1	
Brosse			0				0			1				2				4		
Racleur			0				0			1						0		3		
Balai			0		1					1				1				3		
Cocotte minute	1					2			2					1				1		
Réceptacle (boite tranchants)	10				40				20					10				24		
Solution chlorée			oui				oui				oui				insuffis.					oui
Bottes	1						0				0			1				2		
Alèzes			0				0				0			2				20		
Haricot	7				13						suffisant			4				5		
Antiseptique			oui				oui				oui				oui					oui
Savon	4				5									2				5		
Eponge			0		2						0					0		4		
Tête de loup			0				0			1						0		1		

Gestion des stocks : suivi irrégulier, commande prévisionnelle insuffisante, rupture de stock au district.
 Les approvisionnements sont faits par le district ou le COGES et les dons des étudiants.
 Le renouvellement (torchons, serpillères) peu envisagé, donc de façon générale en mauvais état.
 L'approvisionnement des détergents est insuffisant.
 L'eau de Javel est le principal désinfectant.
 Les dilutions ne sont pas toujours respectées pour la décontamination.
 Les antiseptiques sont délivrés sur ordonnances.
 Les dotations sont trimestrielles ou mensuelles, mais la gestion du stock est mal réalisée.
 Les moyens de stérilisation sont en mauvais état dans certains sites.
 Les poubelles de déchets de pansements ne sont pas nettoyées régulièrement.
 La fréquence de nettoyage des locaux est variable suivant les sites.
 Il est réalisé quotidiennement superficiellement.
 La décontamination des surfaces est très peu réalisée.